

01 / WAT IS INBEGREPEN



**1x Peptide Flacon**  
GELYOFILISEERD POEDER

Alle Peptyds producten worden geleverd als gelyofiliseerd peptidepoeder.

● GEZUIVERDE SEQUENTIE VERZEGELD

04 / OPSLAGCONDITIES



**Gelyofiliseerd Poeder**

Temp: **15–25°C**  
Houdbaarheid: **Protocol Afhankelijk**  
Opmerkingen: Droog bewaren, tegen licht beschermen



**Gereconstitueerde Oplossing**

Temp: **2–8°C**  
Houdbaarheid: **Protocol Afhankelijk**  
Opmerkingen: In koelkast bewaren, niet schudden



**Niet Invriezen**

Invriezen kan de stabiliteit van het peptide beïnvloeden

02 / RECONSTITUTIEPROCES



01

**Werkplek Voorbereiden**

Zorg voor een schone, droge werkplek voordat u begint.



02

**Flacon Inspecteren**

Controleer de integriteit van de flacon en inspecteer het gelyofiliseerde poeder.



03

**Verdunningsmiddel Toevoegen**

Voeg het gekozen steriele verdunningsmiddel toe volgens uw protocol.



04

**Langzaam Oplossen**

Laat de vloeistof voorzichtig langs de binnenwand van de flacon stromen. Niet direct op het poeder spuiten.



05

**Vorzichtig Zwenken**

Rol of zwenk voorzichtig totdat het is opgelost. Nooit schudden.



06

**Helderheid Controleren**

De oplossing moet helder en vrij van zichtbare deeltjes zijn.

03 / VISUELE GIDS



VERDUNNINGSMIDDEL TOEVOEGEN



LANGS WAND STROMEN



VOORZICHTIG ZWENKEN



HELDERE OPLOSSING

**05 / BELANGRIJKE MEDEDELING**

Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor menselijke consumptie. Veilig bewaren en buiten bereik van kinderen houden.

*Geen medisch advies. Raadpleeg een arts.*











01 / PREP CHECKLIST

- ✓ Was de handen grondig.
- ✓ Inspecteer de oplossing op helderheid.
- ✓ Bereid sterile materialen voor.
- ✓ Reinig de injectieplaats.
- ✓ Volg uw onderzoeksprotocol.


05 / VEILIGHEID & BEST PRACTICES

-  **Steriel Materiaal**  
Gebruik altijd gloednieuwe, sterile naalden en spuiten.
-  **Nooit Delen**  
Risico op kruisbesmetting. Deel nooit spuiten.
-  **Juiste Opslag**  
Zorg dat de gemengde flacon in de koelkast staat (2-8°C).
-  **Volg Protocol**  
Wijk niet af van de onderzoeksprotocollen van het lab.
-  **Alleen Onderzoek**  
Chemisch middel niet gecertificeerd voor medisch gebruik.
-  **Besmetting Voorkomen**  
Gooi onmiddellijk weg als er deeltjes of troebelheid verschijnen.

02 / INJECTIEPROCEDURE

 <p><b>1</b></p> <p><b>Reinig Plaats</b> Reinig de gekozen injectieplaats met alcohol en laat deze drogen.</p>	 <p><b>2</b></p> <p><b>Huid Plooien</b> Plooi voorzichtig een huidplooi van 5 cm tussen uw vingers.</p>
 <p><b>3</b></p> <p><b>Naald Inbrengen (45°)</b> Breng de naald met een snelle beweging in onder een hoek van 45°.</p>	 <p><b>4</b></p> <p><b>Langzaam Injecteren</b> Druk de zuiger gelijkmatig en langzaam in om de dosis af te geven.</p>
 <p><b>5</b></p> <p><b>Kort Vasthouden</b> Houd de naald 5 seconden op zijn plaats om volledige afgifte te garanderen.</p>	 <p><b>6</b></p> <p><b>Naald Terugtrekken</b> Trek de naald snel terug onder dezelfde inbrenghoek.</p>
 <p><b>7</b></p> <p><b>Lichte Druk Uitoefenen</b> Druk een steriel gaasje op de plaats. Niet wrijven of masseren.</p>	 <p><b>8</b></p> <p><b>Veilig Afvoeren</b> Plaats de spuit onmiddellijk in een naaldcontainer.</p>
 <p><b>9</b></p> <p><b>Plaats Inspecteren</b> Controleer de injectieplaats op reactie of irritatie.</p>	 <p><b>10</b></p> <p><b>Locaties Roteren</b> Roteer locaties systematisch voor volgende tests.</p>

03 / INJECTIEPLAATSENKAART



Roteer injectiezones systematisch: buik (5 cm rond de navel), buitenkant dijbenen, buitenkant bovenarmen of bovenkant buitenkant billen.

04 / ROTATIEPROTOCOL

